



Persbericht

PB99-181
15 juli 1999
9.30 uur

Zwaarder drankgebruik vooral bij mannen

Meer Nederlanders drinken in 1998 alcohol dan in 1995. Het verschil in drankgebruik tussen mannen en vrouwen is niet veranderd sinds 1989, maar het zijn vooral mannen die meer blijven drinken. Mannen rookten in 1998 nog steeds meer dan vrouwen, maar de verschillen in rookgedrag tussen mannen en vrouwen worden kleiner. Uit nieuwe CBS-gegevens is verder af te leiden dat Nederlanders in 1998 opnieuw meer vrij verkrijgbare geneesmiddelen bij de drogist of apotheek hebben gekocht. Dit gebruik is vanaf 1981 verdubbeld. Het gebruik van op recept verkrijgbare geneesmiddelen is de laatste jaren gelijk gebleven. Verder blijkt dat het tandartsbezoek in 1998 iets is toegenomen. Het aantal bezoeken aan de huisarts en de specialist is de afgelopen jaren stabiel gebleven.

Aantal drinkers stijgt

In 1998 dronken 85 van de honderd inwoners van 16 jaar en ouder wel eens alcohol. In 1995 was dit 80 van de honderd. Meer mannen dan vrouwen drinken wel eens alcohol, 91% van de mannen en 80% van de vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is groter als gekeken wordt naar de mate van alcoholgebruik. Van zwaarder alcoholgebruik is sprake als een persoon minstens één dag in de week zes of meer glazen alcoholhoudende drank nuttigt. Eén op de vijf mannen (21%) kan aangemerkt worden als een zwaardere drinker, van de vrouwen behoort maar 6% tot deze groep.

Verschillen in rookgedrag tussen mannen en vrouwen worden kleiner

Van roken is bekend dat het een nadelig effect heeft op de gezondheid. Ongeveer één op de drie Nederlanders van 16 jaar en ouder, ofwel bijna 4,3 miljoen personen, rookt. Meer mannen roken dan vrouwen, 39% versus 31%. In 1989 lag het percentage rokende mannen nog hoger dan bij vrouwen, 44% versus 31%. Gemiddeld hebben mannen in 1998 evenveel sigaretten per dag gerookt als vrouwen.

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Gebruik vrij verkrijgbare geneesmiddelen blijft toenemen

Het gebruik van geneesmiddelen, die zonder recept verkrijgbaar zijn bij de drogist of apotheek, ligt in 1998 opnieuw hoger dan voorgaande jaren. Tussen 1981 en 1998 is het aantal mensen dat in een periode van 14 dagen voorafgaand aan het onderzoek deze geneesmiddelen gebruikte, verdubbeld: van 16 procent in 1981 naar 33 procent in 1998. Het gebruik van vrij verkrijgbare geneesmiddelen is onder vrouwen hoger dan bij mannen. In 1998 gebruikte 37 procent van de vrouwen vrij verkrijgbare geneesmiddelen en 29 procent van de mannen.

Gebruik geneesmiddelen op recept stabiel

Gemeten in een periode van 14 dagen voorafgaand aan het onderzoek heeft in 1998 één op de drie Nederlanders één of meer geneesmiddelen op voorschrift van een arts gebruikt. Tussen 1984 en 1995 is het percentage gebruikers gestaag toegenomen; de laatste jaren lijkt een eind te zijn gekomen aan deze groei.

In 1998 hebben 43 van de 100 vrouwen in de vruchtbare leeftijd, 16-49 jaar, de anticonceptiepil gebruikt. Het gebruik van de anticonceptiepil lijkt zich de laatste jaren te stabiliseren. Tussen 1981 en 1994 is het gebruik van de anticonceptiepil van 27 naar 45 procent gestegen.

Tandartsbezoek toegenomen

In 1998 hebben bijna 12 miljoen Nederlanders de tandarts minstens één keer bezocht. In totaal zijn ruim 28,5 miljoen bezoeken aan de tandarts gepleegd. Meer vrouwen (79%) dan mannen (76%) bezoeken jaarlijks hun tandarts. Vanaf 1981 gaan zowel mannen als vrouwen vaker naar de tandarts.

Huisarts- en specialistenbezoek op hetzelfde niveau als eerdere jaren

Vorig jaar hebben ruim 11,5 miljoen inwoners een of meerdere keren een huisarts bezocht en bijna 6 miljoen inwoners een specialist. Mannen en vrouwen verschillen in de mate waarin ze een huisarts of een specialist bezoeken. In 1998 bezochten meer vrouwen dan mannen een huisarts, 81% van de vrouwen en 70% van de mannen. Bij bezoeken aan de specialist is het verschil kleiner, 41% van de vrouwen en 35% van de mannen. Vanaf 1995 is het aantal bezoekers aan zowel een huisarts, als een specialist stabiel gebleven.

Technische toelichting

De gegevens over het gebruik van gezondheidsvoorzieningen en leefstijl voor 1998 zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie van het CBS. De gegevens van 1981-1996 zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. In beide onderzoeken worden jaarlijks gegevens verzameld over circa 10 000 respondenten vanaf hun geboorte. Gegevens over roken en drinken zijn vanaf 1989 beschikbaar. Meer gedetailleerde gegevens over de ontwikkelingen in gezondheid, gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen en leefstijl van de Nederlandse bevolking zijn op aanvraag beschikbaar.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, mw. drs. J.J.M. Geurts, tel. (045) 570 72 01. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1: Gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen					
	1981	1985	1990	1995	1998
	% van de bevolking				
Huisarts	69	72	75	75	76
Tandarts	61	67	71	75	78
Specialist	36	38	41	39	38
Opname ziekenhuis	7	7	7	7	6
Fysiotherapie	7	10	14	14	15
Alternatieve genezer	4	5	6	6	6
Voorgeschreven geneesmiddelen in 14 dagen	.	28	30	33	33
Vrij verkrijgbare geneesmiddelen in 14 dagen	16	19	21	29	33
	% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd (16-49 jaar)				
Anticonceptiepil	27	29	34	43	43

Bron: CBS Gezondheidsenquête 1981-1996, CBS Permanent Onderzoek Leefsituatie 1998

Tabel 2: Roken en drinken					
	1981	1985	1990	1995	1998
	% van de bevolking van 16 jaar en ouder				
Rokers	.	.	37	36	35
Drinkers	.	.	80	80	85

Bron: CBS Gezondheidsenquête 1981-1996, CBS Permanent Onderzoek Leefsituatie 1998